



LEVONORGESTREL - 0,75mg

THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP



WHO-GMP

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của
Bộ y tế: 283/2017/XNQC QLD ngày 29/9/2017
Tài liệu này có 12 trang.

Thông tin chi tiết xem ở trang 2 đến 7

Ngày in tài liệu:
13/10/2017



THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP



TÊN THUỐC: NEWCHOICE EC.

THÀNH PHẦN: Levonorgestrel 0,75mg. Tá dược
vừa đủ 1 viên gồm: Lactose, Amidon, PVP K30,
Magnesi stearat.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vỉ x 2 viên.



CHỈ ĐỊNH: NEWCHOICE EC là thuốc ngừa thai khẩn cấp, có thể tránh thụ thai trong vòng 72 giờ sau cuộc giao hợp không được bảo vệ. Được dùng trong những trường hợp:

- Nếu không dùng biện pháp tránh thai nào khi giao hợp;
- Nếu biện pháp tránh thai đã dùng không đáng tin cậy;
- Bao cao su bị rách, trượt hay dùng sai;
- Màng chắn âm đạo hay thuốc ngừa thai đặt âm đạo bị đặt sai chỗ, rách hay lấy ra sớm;
- Giao hợp gián đoạn không thành công;
- Tính sai ngày rụng trứng trong trường hợp dùng phương pháp lịch;
- Vòng tránh thai bị lấy ra hay bị mất;
- Quên dùng ≥ 03 viên thuốc ngừa thai dùng hàng ngày trở lên;
- Bị hiếp dâm.



LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống 1 viên NEWCHOICE EC càng sớm càng tốt ngay sau khi giao hợp không dùng biện pháp tránh thai, hoặc biện pháp tránh thai đã dùng không đáng tin cậy. Tốt nhất là trong vòng 48h và không để quá 72 giờ. Uống viên thứ 2 sau viên thứ nhất 12 giờ (không được trễ hơn 16 giờ). Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống viên đầu tiên thì phải uống lại. Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống viên thứ hai thì phải uống lại thuốc hoặc phải gấp ngay bác sỹ hoặc dược sỹ để được hướng dẫn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mang thai hoặc nghi ngờ mang thai. Chảy máu âm đạo bất thường không chuẩn đoán được nguyên nhân. Viêm tắc tĩnh mạch hoặc bệnh huyết khối tắc mạch thể hoạt động. Bệnh gan cấp tính, u gan lành hoặc ác tính. Carcinom vú hoặc có tiền sử bệnh đó. Vàng da hoặc ngứa dai dẳng trong lần có thai trước.



TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Có thể gây buồn nôn, nôn. Rong huyết xảy ra sau 2-3 ngày dùng thuốc rồi ngừng ngay. Trong phần lớn các trường hợp, một thời gian hành kinh mới bắt đầu đúng như mong đợi hoặc sớm hơn. Nếu thời gian hành kinh này chậm hơn 7 ngày nên đi thử thai. Nếu xuất huyết trầm trọng hay kéo dài nên đi khám phụ khoa. Hiếm khi xảy ra những tác dụng phụ khác như nhũn vú, nhức đầu, choáng váng, mệt mỏi. Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

TƯƠNG TÁC THUỐC: Các thuốc dùng đồng thời như ampicilin, rifampicin, cloramphenicol, neomycin, sulfamid, tetracyclin, barbiturate và phenylbutazol có thể giảm hiệu quả ngừa thai của Newchoice EC.



THẬN TRỌNG: Dùng rất thận trọng khi bị hen suyễn, suy tim, cao huyết áp, nhức nửa đầu, động kinh, suy thận, tiểu đường, chứng tăng lipid huyết, trầm cảm và trong những trường hợp đang mắc viêm tĩnh mạch huyết khối hoặc đột quy. Chế phẩm này đặc biệt chỉ dùng cho trường hợp ngừa thai khẩn cấp đã nói trên, không được dùng thường xuyên.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ: Không được dùng.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Chưa có thông báo nào cho thấy dùng quá liều thuốc tránh thai gây tác dụng xấu nghiêm trọng. Tuy vậy, nếu quá liều được phát hiện sớm trong vòng 1 giờ và với liều lớn tới mức mà thấy nên xử trí thì có thể rửa dạ dày hoặc dùng một liều ipecacuanha thích hợp. Không có thuốc giải độc đặc hiệu và điều trị là theo triệu chứng.



HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng nếu thấy viên thuốc bị bở, bị biến màu hoặc thấy hiện tượng khác lạ và báo cho nhà sản xuất biết.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NHÀ SẢN XUẤT: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà – 415 Hàn Thuyên, Nam Định, Việt Nam.

NHÀ PHÂN PHỐI: Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng – P605, Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Liên hệ:

Phone: 024 3795 4165

Email: contact@goldenchoice.com.vn

Website: www.goldenchoice.com.vn



Marketing và phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG
GOLDEN CHOICE CO., LTD

P 605 - Indochina Plaza - 241 Xuân Thủy -
Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024 3795 4165 (108)

Fax: 024 3795 4166

Theo Li-xăng bởi:

DKT International USA



Sản xuất tại:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
(NAMHA PHARMA)

415 Hàn Thuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định

NEWCHOICE EC là thuốc ngừa thai khẩn cấp, có thể tránh thụ thai trong vòng 72 giờ sau cuộc giao hợp không được bảo vệ.



THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP **NEWCHOICE EC**

Uống một viên NEWCHOICE EC càng sớm càng tốt ngay sau giao hợp không dùng biện pháp tránh thai, hoặc biện pháp tránh thai đã dùng không đáng tin cậy.

Viên thứ nhất



Tốt nhất
trong vòng 48h

Không để
quá 72h

- Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống viên đầu tiên thì phải uống lại.
- Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống viên thứ hai thì phải uống lại thuốc hoặc phải gấp ngay bác sĩ hoặc dược sỹ để được hướng dẫn.

Viên thứ hai



Sau viên thứ nhất
12h

Không được
trễ hơn 16h

Levonorgestrel là một chất Progestogen tổng hợp dẫn xuất từ Nortestosteron. Khi sử dụng liều cao (0,75mg) sẽ tạo phản ứng Feedback(-) làm giảm đột ngột nồng độ Progesterol trong máu làm ức chế rụng trứng.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ① Dược thư Quốc gia Việt Nam.
- ② Tài liệu HDSD đã được Bộ Y tế phê duyệt.