

WHO-GMP

# new CHOICE EC

LEVONORGESTREL - 0,75mg

## THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP

**THÀNH PHẦN:** Levonorgestrel 0,75mg. Tá dược vừa đủ 1 viên gồm: Lactose, Amidon, PVP K30, Magnesi stearat.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nén.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 vỉ x 2 viên.

**CHỈ ĐỊNH:** NEWCHOICE EC là thuốc ngừa thai khẩn cấp, có thể tránh thụ thai trong vòng 72 giờ sau cuộc giao hợp không được bảo vệ. Được dùng trong những trường hợp:

- Nếu không dùng biện pháp tránh thai nào khi giao hợp;
- Nếu biện pháp tránh thai đã dùng không đáng tin cậy:
  - + Bao cao su bị rách, trượt hay dùng sai
  - + Màng chắn âm đạo hay thuốc ngừa thai đặt âm đạo bị đặt sai chỗ, rách hay lấy ra sớm
  - + Giao hợp gián đoạn không thành công
  - + Tính sai ngày rụng trứng trong trường hợp dùng phương pháp lịch
  - + Vòng tránh thai bị lấy ra hay bị mất
  - + Quên dùng ≥ 03 viên thuốc ngừa thai dùng hàng ngày trở lén
  - Bị hiếp dâm.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Uống 1 viên NEWCHOICE EC càng sớm càng tốt ngay sau khi giao hợp không dùng biện pháp tránh thai, hoặc biện pháp tránh thai đã dùng không đáng tin cậy. Tốt nhất là trong vòng 48h và không để quá 72 giờ. Uống viên thứ 2 sau viên thứ nhất 12 giờ (không được trễ hơn 16 giờ). Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống viên đầu tiên thì phải uống lại. Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống viên thứ hai thì phải uống lại thuốc hoặc phải gặp ngay bác sĩ hoặc dược sỹ để được hướng dẫn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mang thai hoặc nghi ngờ mang thai. Chảy máu âm đạo bất thường không chuẩn đoán được nguyên nhân. Viêm tắc tĩnh mạch hoặc bệnh huyết khối tắc mạch thể hoạt động. Bệnh gan cấp tính, u gan lành hoặc ác



tính. Carcinom vú hoặc có tiền sử bệnh đó. Vàng da hoặc ngứa dai dẳng trong lần có thai trước.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Có thể gây buồn nôn, nôn. Rong huyết xảy ra sau 2-3 ngày dùng thuốc rồi ngừng ngay. Trong phần lớn các trường hợp, một thời gian hành kinh mới bắt đầu đúng như mong đợi hoặc sớm hơn. Nếu thời gian hành kinh này chậm hơn 7 ngày nên đi thử thai. Nếu xuất huyết trầm trọng hay kéo dài nên đi khám phụ khoa. Hiếm khi xảy ra những tác dụng phụ khác như nhũn vú, nhức đầu, choáng váng, mệt mỏi. Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

**THẬN TRỌNG:** Dùng rất thận trọng khi bị hen suyễn, suy tim, cao huyết áp, nhức nửa đầu, động kinh, suy thận, tiểu đường, chứng tăng lipid huyết, trầm cảm và trong những trường hợp đang mắc viêm tĩnh mạch huyết khối hoặc đột quỵ. Chế phẩm này đặc biệt chỉ dùng cho trường hợp ngừa thai khẩn cấp đã nói trên, không được dùng thường xuyên.

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không được dùng.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**TÀI LIỆU THAM KHẢO:** 1. Dược thư Quốc gia Việt Nam. 2. Tài liệu HDSD đã được Bộ Y tế phê duyệt.



Marketing và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG (GOLDEN CHOICE CO., LTD)  
P 605 - Indochina Plaza - 241 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội  
Điện thoại: 024 3795 4165 (108) | Fax: 024 3795 4166  
Theo Li-xăng bởi: DKT International USA



Sản xuất tại:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ  
(NAMHA PHARMA)  
415 Hàn Thuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định